

PEDIKULIOZĖ

Kas yra galvinės utėlės?

Galvinės utėlės yra maži sezamo sėklos dydžio pilkai rudos spalvos vabzdžiai, kurie gyvena žmonių plaukuose ir maitinasi žmogaus krauju. Utėlės deda mažus baltus ovalo formos kiaušinius ir juos priklįuoja prie plauko, arti šaknies. Gyvą galvos utėlę išvelgti sunku, tačiau atidžiai apžiūrint plaukus gerai matomi kiaušiniai (glindos). Utėlių kiaušinių ir gyvų utėlių dažniausiai randama plaukuose už ausų, kaktos ir pakaušio srityje.

Utėlėtumo požymiai

Pirmasis užsikrėtimo utėlėmis ženklas – galvos niežulys, kuris atsiranda dėl galvinių utėlių įkandimo. Kitas požymis – įkandimų ženklai – smulkūs melsvi 0,2–3 mm diametro taškeliai. Kitas požymis – įkandimų ženklai – smulkūs melsvi 0,2–3 mm diametro taškeliai.



Kaip plinta utėlės?

Utėlėmis užsikrečiama sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu: vaikų kolektyvuose, perpildytame transporte, keičiantis drabužiais, patalyne, šepėčiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis. Esant panašioms situacijoms utėlė gali patekti nuo vieno asmens galvos ant kito žmogaus galvos.

Utėlių naikinimas

1. Naudokite gydytojų ar vaistininkų rekomenduojamus pedikuliocidus, vadovaukitės nurodymais ant pakuotės.
2. Specialiomis šukomis pašalinkite kiek galima daugiau kiaušinių.
3. Švarinkite savo namus tuo pačiu metu, kai gydote savo vaiką: mirkykite šukas ir šepėčius 5–10 minučių utėlių naikinimo šampūne arba 1 valandą karštame 60° vandenyje; paklodes, užvalkalus ir kitą patalynę skalbimo mašinoje skalbkite kiek įmanoma šiltesniame vandenyje; nescalbiamus daiktus sudėkite į plastikinį maišelį ir laikykite 1 savaitę; kruopščiai išsiurbkite minkštus baldus, kilimus ir čiužinius.
4. Antrą kartą naudokite pedikuliocidus praėjus 7–10 dienų po pirmojo gydymo (arba vadovaukitės produkto gamintojo rekomendacija).

